

تمرين عدد 1 : (3 نقاط)

يلٰي كل سؤال ثلات إجابات إحداها فقط صحيحة.

أنقل في كلّ مرّة على ورقة تحريرك رقم السؤال والإجابة الصحيحة الموافقة له.

- (1) يكون العدد $a = 7085a$ (حيث a رقم أحداهـ) يقبل القسمة على 6 ولا يقبل القسمة على 12 في حالة :

a = 6 / ج a = 4 / ب a = 0 / أ

- (2) إذا كان x عدد حقيقي موجب قطعاً يحقق $x^2 + \frac{1}{x^2} = 14$ فإن $\frac{1}{x}$ يساوي:

أ / $\sqrt{14}$ ب / 7 ج / 4


- (3) المخطط الدائري المقابل يمثل توزيع تلاميذ مدرسة إعدادية حسب المستوى:

حيث $AOC = 144^\circ$ و $AOB = 90^\circ$ إذن نسبة تلميذ السنة الثامنة تساوي:

40% ج / 35% ب / 30% أ /

- (4) لتكن المجموعة $E = \{a, b, c, d, e\}$ ، نقوم بترتيب هذه العناصر بصورة عشوائية (في كلّ رتبة عنصر وحيد) إذن إحتمال أن يكون a في الرتبة الأولى و b في الرتبة الثانية هو:

ج / 20% ب / 10% أ / 5%



تمرين عدد 2 : (3 نقاط)

ليكن العدد الحقيقي $a = 1 + \sqrt{3}$.

أ / بيـن أن $a^2 = 4 + 2\sqrt{3}$ واستنتج أن $a^2 = 2a + 2$

ب / بيـن أن $a^3 = 6a + 4$ وأن $a^6 = 120a + 88$

ج / استنتاج القيمة العددية لـ a^6 .

تمرين عدد 3 : (5 نقاط)

I. نعتبر العبارة $A = x^2 + 4x - 12$ حيث x عدد حقيقي.

- (1) أحسب القيمة العددية للعبارة A إذا كان $x = 2$

(2) أ / بيـن أن $A = (x + 2)^2$.

ب / فـكـ العـبـارـةـ Aـ إـلـىـ جـذـاءـ عـوـامـلـ.


ج / حلـ في Rـ المعـادـلةـ A = 0.

II. في الرسم المقابل لدينا: ABCD شبه منحرف قائم في A و D.

على [AD] و N على [BC] حيث: (MN) موازي لـ (AB)

x) $NC = x + 4$ و $AM = x$ ، $BN = 6$ ، $MD = 2$ عدد حقيقي

موجب).



(1) أ/ بين أن $x^2 + 4x - 12 = 0$ واستنتج أن $\frac{x}{3} = \frac{4}{x+4}$

ب/ جد x واستنتج أن $BC = 12$ و $AD = 4$.

ج/ أحسب MN بدلالة $b = CD$ و $a = AB$.

(2) ليكن H المسقط العمودي لـ B على (CD) .

أ/ بين أن $ABHD$ مستطيل واستنتاج أن $HC = b$.

ب/ بين أن $b = 8\sqrt{2}$.

ج/ جد a و b إذا علمت أن محيط $ABCD$ يساوي 32.

تمرين عدد 4 : (6 نقاط)

(وحدة قيس الطول هي الصنتمتر)

نعتبر قطعة المستقيم $[BC]$ حيث $BC = 8$. لتكن النقطة O منتصف $[BC]$.

(1) أ/ أرسم المستقيم Δ الموسّط العمودي لـ $[BC]$.

ب/ عين على Δ نقطة A بحيث $OA = 3$.

ج/ أحسب AB .

(2) لتكن E صورة النقطة B بالتناظر المركزي S_A .

أ/ بين أن المستقيمين (OA) و (EC) متوازيان. أحسب CE .

ب/ استنتاج أن (EC) عمودي على (BC) .

(3) لتكن γ الدائرة التي قطرها $[BC]$. في قطع (AB) في نقطة ثانية D .

بين أن $CD \times BE = CE \times CB$ واستنتاج أن $CD = 4,8$.

(4) بين أن $ED = 3,6$ واستنتاج AD .

(5) المستقيمان Δ و (CD) يتقاطعان في نقطة F .

أ/ بين أن $\frac{DA}{DE} = \frac{AF}{EC}$.

ب/ استنتاج AF .

تمرين عدد 5 : (4 نقاط)

في الرسم المقابل $SABCD$ هرم منتظم.

قاعدته: المربع $ABCD$ قيس ضلعه $AB = 4\sqrt{2}$ ومركزه O .

ارتفاع الهرم: $SO = 4$

(1) أ/ أحسب SA قيس حرف الهرم.

ب/ ما هي طبيعة أوجه الهرم $SABCD$.


(2) ليكن H و K المسقطات العمودية لـ O على (SA) و (SB) .

على التوالي

أ/ أحسب SH و OH .

ب/ أحسب OK و SK .

ج/ برهن أن (HK) موازي للمستقيم (AB) .



تمرين عدد 1 : (3 نقاط)

يلبي كل سؤال ثلاثة إجابات إحداها فقط صحيحة.

أنقل في كل مرّة على ورقة تحريرك رقم السؤال والإجابة الصحيحة الموافقة له.

- (1) عدد الأعداد الصحيحة الطبيعية ذات ثلاثة أرقام مختلفة من بين: 0 و 1 و 2 و 3 و 5 و 6 والتي تقبل القسمة على 12 وعلى 15 في آن واحد هو :

أ/ 2 ب/ 4 ج/ 8

(2) مجموعة حلول المتراجحة $|x - 2| < 1$ هي:

أ/ $[1, 3]$ ب/ $[3, +\infty)$ ج/ $[-\infty, 1]$

- (3) في معين متعمد ومتقابل للمستوي (O, I, J) لدينا النقاط $A(0, 2)$ و $B(-2, 0)$ و $C(0, 3)$
اذن مركز ثقل المثلث ABC هو:

أ/ O ب/ I ج/ J

- (4) عند رمي نرد مكعب أوجهه مرقطة من 1 إلى 6 فإن احتمال الحصول على عدد أولي (على الوجه العلوي) يساوي

أ/ $\frac{1}{3}$ ب/ $\frac{1}{2}$ ج/ $\frac{2}{3}$

تمرين عدد 2 : 3.5 نقاط

نعتبر العدددين الحقيقيين: $b = \sqrt{\sqrt{5} + 2} - \sqrt{\sqrt{5} - 2}$ و $a = \sqrt{\sqrt{5} + 2} + \sqrt{\sqrt{5} - 2}$.

(1) أ/ أحسب a^2 واستنتج أنّ

$b = \sqrt{2\sqrt{5} - 2}$ واستنتاج أنّ

ج/ برهن أنّ $ab = 4$

(2) ليكن العدد الحقيقي $.C = \frac{a}{b} - \frac{b}{a}$

بین أنّ C عدد صحيح طبيعي.

تمرين عدد 3 : 4.5 نقاط

في الرسم المقابل ABC مثلث حيث $AB = AC$ و $BC = 1$ و $\hat{BAC} = 36^\circ$. الهدف في هذا التمرين حساب AB .


(1) منصف الزاوية $A\hat{C}B$ يقطع $[AB]$ في D ويقطع المستقيم

الموازي لـ (AC) والمار من B في E .

أ/ أحسب أقيمة زوايا المثلث BCD واستنتاج أنّ $DC = 1$.

ب/ برهن أنّ $AD = BE = 1$.

(2) نرمز بـ x لقياس AB .



أ/ بَيْنَ أَنْ: $\frac{1}{x-1} = \frac{x}{1}$

ب/ استنتج أن $x^2 - x - 1 = 0$

أ/ بَيْنَ أَنْ: $x^2 - x - 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2$ (3)

ب/ حل في \mathbb{R} المعادلة $x^2 - x - 1 = 0$

ج/ استنتج AB .

تمرين عدد 4 : (4 نقاط)



في الرسم المقابل $ABCD$ مستطيل حيث $AB = \sqrt{2} \cdot AD$ حيث $I = C^*D$

(1) الهدف في هذا السؤال برهنة أن (AI) و (BD) متعامدين نرمز به لقياس AD .

أ/ بَيْنَ أَنْ: $AI = \frac{\sqrt{6}}{2}a$ و $BD = \sqrt{3}a$

ب/ ليكن H نقطة تقاطع (BD) و (AI) .
أ/ بَيْنَ أَنْ H هو مركز ثقل المثلث ACD .

ج/ استنتاج أن $AH = \frac{\sqrt{6}}{3}a$ و $DH = \frac{\sqrt{3}}{3}a$


د/ برهن أن المثلث ADH قائم الزاوية في H واستنتاج المطلوب.

(2) المستقيم (AI) يقطع (BC) في K .

أ/ برهن أن K هو المركز القائم للمثلث BDI .

ب/ استنتاج أن (BI) و (DK) متعامدين.

تمرين عدد 5 : (4 نقاط)



في الرسم المقابل $ABCDA'B'C'D'$ متوازي مستطيلات حيث $AA' = \sqrt{11}$ و $AD = 3$ ، $AC = 5$

أ/ أحسب AB و AC' .

ب/ ليكن H المسقط العمودي لـ B على (AC) .

أ/ أحسب BH و CH .

ب/ برهن أن المثلث HCC' قائم الزاوية في C ثم أحسب HC' .

ج/ المستقيم العمودي على المستوى (ABC) والمار من H يقطع (AC') في K .

أحسب HK و KC' .